ANNUEL:

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier 63034 Clermont Ferrand Cedex (73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

Le 16 Juillet 1984

N'24

MAIS

PYRALE

¥ Situation

Les captures auxpiègessexuelsse sont intensifiées <u>la semaine</u> dernière, particulièrement en Limagne.

Les premières pontes ont été notées dès le 10 Juillet dans le Puy-de-Dôme.

La nymphose en cage d'élevage de Marmilhat se poursuit ($50\ \%$ d'individus nymphosés le $10\ \mathrm{Juillet}$).

Le mais a eu une croissance rapide depuis début Juillet. Les panicules mâles sont déjà visibles en zones précoces (variétés précoces).

≯Préconisation

En tenant compte de l'évolution de la pyrale (ponte...) mais aussi du stade des maïs, nous conseillons d'intervenir à l'aide de microgranulés se-lon les zones aux périodes suivantes :

PUY-DE-DOME (1) - ALLIER

Dès réception du bulletin et juqu'au 26 Juillet.

(1) Travail réalisé en collaboration avec les Etablissements LIMAGRAIN et MAICENTRE

CORREZE - HAUTE-VIENNE - CREUSE

A partir du 20 Juillet et jusqu'à fin Juillet.

Il est possible de situer le risque de chaque parcelle par l'observation des pontes (plaques d'oeufs nacrées se situant à la face inférieure des feuilles.

Un traitement est justifié dès que 10 pontes sur 100 pieds

sont notées.

Les mais les plus précoces seront traités en premier.

La meilleure rétention des microgranulés sur le mais est obtenue au moment où les panicules mâles sont visibles au fond du cornet.

Utiliser un microgranulé à sa dose homologuée (voir notre Bul-letin n° 22 du 5 Juillet).

LIMAGRAIN préconise PERTHRINE MG pour ses mais semence (peu toxique pour le personnel de castration).

PUCERONS

Les infestations de pucerons sur le feuillage des mais n'ont pas progressé depuis le 5 Juillet.

Aucune intervention ne se justifie.

